

**Gesamtartenliste der
Webspinnen (Araneae)
des Saarlandes**

3. Fassung

von

Aloysius Staudt

Minister für Umwelt und DELATTINIA (Hrsg.)
„Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“

PDF-Ausgabe 2020

Impressum

Schriftleitung: Thomas Schneider

Layout: Thomas Schneider

© Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und DELATTINIA 2020

Dies ist eine vereinfachte PDF-Ausgabe der „Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“ und beinhaltet ausschließlich die Gesamtartenliste der Webspinnen (Araneae) des Saarlandes.

Die Herausgeber übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die in den Beiträgen geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen der Herausgeber übereinstimmen.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Nachdruck, auch in Auszügen, nur mit Genehmigung der Herausgeber.

Saarbrücken und Landsweiler-Reden 2020

Ministerium für
Umwelt und
Verbraucherschutz

SAARLAND



Gesamtartenliste der Webspinnen (Araneae) des Saarlandes

3. Fassung

Aloysius Staudt

Typ: Kommentierte Checkliste

Bearbeitungsstand: 30.09.2019

Schlüsselwörter: Gesamtartenliste, Checkliste, Saarland, Webspinnen, Araneae

Einleitung

Die letzte Checkliste (STAUDT 2008) beruhte auf Kartierungsergebnissen von 1988 bis zum Jahr 2005. Danach wurden die Kartierungsarbeiten mit gleicher Intensität noch weiter fortgesetzt bis sie dann Ende 2009 eingestellt wurden, da sich das Interesse auf andere Artengruppen verlagerte und Spinnen nur noch sporadisch, quasi als Beifänge, miterfasst wurden. Auf Basis dieser Daten wurde die hier vorgestellte Gesamtartenliste der Webspinnen des Saarlandes aktualisiert.

Taxonomische Referenz

Die Nomenklatur der wissenschaftlichen Namen richtet sich nach PLATNICK (2014).

Heutige Bestandssituation

Die jetzt vorgestellte Liste stützt sich auf 45.263 Fundmeldungen. Bei Einsatz von Barberfallen erhält man häufig im Jahresverlauf mehr als einen Nachweis für eine Art pro Sammelstelle. Diese Mehrfachnachweise werden für die Angabe der Nachweishäufigkeit als eine Meldung gewertet.

Nachweishäufigkeit und Häufigkeitsklassenbildung bei den Webspinnen:

es	1–2
ss	3–6
s	7–29
mh	30–53
h	54–115
sh	117–698

Sippenbilanz

Bilanzierung der Anzahl Taxa bzw. Namen	Anzahl
Gesamtzahl aller Taxa bzw. Namen (Zeilen)	537
Etablierte Taxa (I, N)	500
Nicht etablierte Taxa bzw. Namen	1
Unbeständige Taxa (U)	1
Problematische Namen (?)	0
Ausgeschlossene Taxa (F und kN)	0
Supragenerische Taxa, Zwischenüberschriften	36

Listenteil

Die Erläuterungen der Artengruppen übergreifend vereinbarten Symbole und Abkürzungen finden sich im Methodenteil.

Erläuterung der Spalten

Name: wissenschaftlicher Name (inkl. Autor) und Zwischenüberschriften. Das Zeichen ^ verweist auf einen Kommentar bzw. eine Anmerkung.

St.: Etablierungsstatus des Taxons im Saarland.

BE: Häufigkeitskategorien zur Beschreibung des aktuellen Bestandes.

Gesamtartenliste

Name	St.	BE
Atypidae - Tapezierspinnen		
<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	I	h
<i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)	I	mh
Scytodidae - Speispinnen		
<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	I	ss
Pholcidae - Zitterspinnen		
<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	I	s
<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	I	?
<i>Psilochorus simoni</i> (Berland, 1911)	N	es
Segestriidae - Fischernetzspinnen		
<i>Segestria bavaria</i> C. L. Koch, 1843	I	es
<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	I	mh
Dysderidae - Sechsaugenspinnen		
<i>Dysdera crocata</i> C. L. Koch, 1838	I	es
<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	I	h
<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	I	h
<i>Harpactea rubicunda</i> (C. L. Koch, 1838)	I	ss
Mimetidae - Spinnenfresser		
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	I	mh
<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911	I	mh
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	I	h
<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	I	es
Uloboridae - Kräselradnetzspinnen		
<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C. L. Koch, 1834)	I	s
<i>Uloborus plumipes</i> Lucas, 1846	N	es
Nesticidae - Höhlenspinnen		
<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1757)	I	s
Theridiidae - Kugelspinnen		
<i>Anelosimus vittatus</i> (C. L. Koch, 1836)	I	h
<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)	I	mh
<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	I	mh
<i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall, 1834)	I	ss
<i>Dipoena erythropus</i> (Simon, 1881)	I	s

Name	St.	BE
<i>Dipoena melanogaster</i> (C. L. Koch, 1837)	I	h
<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)	I	es
<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	I	mh
<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)	I	s
<i>Enoplognatha oelandica</i> (Thorell, 1875)	I	es
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	I	sh
<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	I	h
<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876	I	es
<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	I	mh
<i>Euryopis flavomaculata</i> (C. L. Koch, 1836)	I	mh
<i>Heterotheridion nigrovariegatum</i> (Simon, 1873)	I	es
<i>Lasaeola coracina</i> (C. L. Koch, 1837)	I	mh
<i>Lasaeola tristis</i> (Hahn, 1833)	I	h
<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	I	sh
<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	I	h
<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	I	s
<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)	I	ss
<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	N	s
<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	I	ss
<i>Phycosoma inornatum</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	I	ss
<i>Phylloneta impressa</i> (L. Koch, 1881)	I	h
<i>Phylloneta sisypbia</i> (Clerck, 1757)	I	h
<i>Platnickina tinctoria</i> (Walckenaer, 1802)	I	h
<i>Robertus arundineti</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	s
<i>Robertus kuehnae</i> Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993	I	es
<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	I	h
<i>Robertus neglectus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	s
<i>Rugathodes instabilis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	mh
<i>Simitidion simile</i> (C. L. Koch, 1836)	I	mh
<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)	I	s
<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	I	s
<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)	N	ss
<i>Theonoe minutissima</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	I	es
<i>Theridion hannoniae</i> Denis, 1944	I	s
<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914	I	es
<i>Theridion melanurum</i> Hahn, 1831	I	s
<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870	I	h
<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)	I	s
<i>Theridion pinastrum</i> L. Koch, 1872	I	s
<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833	I	h
Theridiosomatidae - Zwergnetzspinnen		
<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)	I	s
Anapidae - Zwergkugelspinnen		
<i>Comaroma simoni</i> Bertkau, 1889	I	es
Linyphiidae - Zwerg- und Baldachinspinnen		
<i>Agyneta affinis</i> (Kulczynski, 1898)	I	h
<i>Agyneta cauta</i> (O. P.-Cambridge, 1902)	I	s

Name	St.	BE
<i>Agyneta conigera</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	l	s
<i>Agyneta decora</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	l	es
<i>Agyneta equestris</i> (L. Koch, 1881)	l	es
<i>Agyneta innotabilis</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	l	es
<i>Agyneta mollis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	l	h
<i>Agyneta ramosa</i> Jackson, 1912	l	es
<i>Agyneta rurestris</i> (C. L. Koch, 1836)	l	sh
<i>Agyneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	l	h
<i>Agyneta subtilis</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	l	es
<i>Araeonus humilis</i> (Blackwall, 1841)	l	h
<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)	l	s
<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)	l	es
<i>Bathyphantes approximatus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	l	mh
<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	l	h
<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	l	h
<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	l	h
<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)	l	mh
<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)	l	h
<i>Centromerus arcanus</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	l	es
<i>Centromerus brevipalpus</i> (Menge, 1866)	l	s
<i>Centromerus dilutus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	l	s
<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)	l	mh
<i>Centromerus pabulator</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	l	mh
<i>Centromerus prudens</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	l	es
<i>Centromerus serratus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	l	s
<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)	l	h
<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)	l	mh
<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	l	mh
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	l	mh
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	l	h
<i>Collinsia inerrans</i> (O. P.-Cambridge, 1885)	l	mh
<i>Dicymbium nigrum brevisetosum</i> Locket, 1962	l	s
<i>Dicymbium nigrum</i> s. str. (Blackwall, 1834)	l	h
<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	l	mh
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	l	mh
<i>Diplocephalus lusiscus</i> (Simon, 1872)	l	es
<i>Diplocephalus permixtus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	l	s
<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	l	h
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	l	h
<i>Dismodicus bifrons</i> (Blackwall, 1841)	l	h
<i>Dismodicus elevatus</i> (C. L. Koch, 1838)	l	es
<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1832)	l	s
<i>Drepanotylus uncatu</i> (Thorell, 1873)	l	es
<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	l	mh
<i>Entelecara congenera</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	l	s
<i>Entelecara erythropus</i> (Westring, 1851)	l	ss
<i>Entelecara flavipes</i> (Blackwall, 1834)	l	mh
<i>Erigone atra</i> (Blackwall, 1841)	l	sh

Name	St.	BE
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	I	sh
<i>Erigonella hiemalis</i> (Blackwall, 1841)	I	mh
<i>Erigonella ignobilis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	es
<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	I	mh
<i>Frontinellina frutetorum</i> (C. L. Koch, 1834)	I	es
<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)	I	ss
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	I	h
<i>Gonatium hilare</i> (Thorell, 1875)	I	es
<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)	I	s
<i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)	I	s
<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)	I	mh
<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	h
<i>Gongylidiellum vivum</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	I	h
<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	I	h
<i>Hilaira excisa</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	s
<i>Hylyphantes nigrinus</i> (Simon, 1881)	I	es
<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)	I	h
<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	I	es
<i>Jacksonella falconeri</i> (Jackson, 1908)	I	ss
<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)	I	ss
<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	I	s
<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)	I	s
<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)	I	s
<i>Leptorhoptrum robustum</i> (Westring, 1851)	I	s
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1829	I	h
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)	I	mh
<i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)	I	mh
<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)	I	mh
<i>Megalepthyphantes nebulosus</i> (Sundevall, 1830)	I	s
<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)	N	mh
<i>Metopobactrus prominulus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	I	s
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	I	h
<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	I	h
<i>Microlinyphia impigra</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	s
<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundewall, 1829)	I	h
<i>Microneta variata</i> (Blackwall, 1841)	I	mh
<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)	I	s
<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)	I	mh
<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)	I	ss
<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)	I	s
<i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884)	I	es
<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)	I	es
<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1841)	I	s
<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1829)	I	sh
<i>Neriere emphana</i> (Walckenaer, 1841)	I	mh

Name	St.	BE
<i>Neriere hammeni</i> (Van Helsdingen, 1963)	I	s
<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1757)	I	mh
<i>Neriere peltata</i> (Wider, 1834)	I	h
<i>Neriere radiata</i> (Walckenaer, 1841)	I	ss
<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	I	ss
<i>Nusoncus nasutus</i> (Schenkel, 1925)	I	es
<i>Obscuriphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)	I	s
<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)	I	mh
<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	I	h
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	I	h
<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	I	h
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	I	mh
<i>Ostearius melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	N	s
<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)	I	mh
<i>Palliduphantes insignis</i> O. P.-Cambridge, 1913	I	s
<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	h
<i>Panamomops inconspicuus</i> (Miller & Valesova, 1964)	I	s
<i>Panamomops mengei</i> Simon, 1926	I	es
<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)	I	ss
<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	I	h
<i>Pelecopsis radicola</i> (L. Koch, 1872)	I	ss
<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C. L. Koch, 1836)	I	es
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	I	h
<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	I	h
<i>Pociloneta variegata</i> (Blackwall, 1841)	I	ss
<i>Porrhomma campbelli</i> F. O. P.-Cambridge, 1894	I	s
<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)	I	es
<i>Porrhomma egeria</i> Simon, 1884	I	s
<i>Porrhomma errans</i> (Blackwall, 1841)	I	ss
<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	h
<i>Porrhomma microps</i> (Roewer, 1931)	I	es
<i>Porrhomma oblitum</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	s
<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	I	s
<i>Porrhomma rosenhaueri</i> (L. Koch, 1872)	I	es
<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)	I	es
<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)	I	h
<i>Saloca diceros</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	ss
<i>Silometopus bonessi</i> Casemir, 1970	I	s
<i>Silometopus elegans</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	I	es
<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	I	s
<i>Sintula corniger</i> (Blackwall, 1856)	I	s
<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	I	h
<i>Styloctetor compar</i> (Westring, 1861)	I	mh
<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1869)	I	es
<i>Tallusia experta</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	I	mh
<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)	I	mh

Name	St.	BE
Tapinocyba praecox (O. P.-Cambridge, 1873)	l	mh
Tapinopa longidens (Wider, 1834)	l	s
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)	l	s
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)	l	ss
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)	l	h
Tenuiphantes mengei Kulczynski, 1887	l	h
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)	l	mh
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)	l	sh
Tenuiphantes zimmermanni Bertkau, 1890	l	h
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)	l	es
Tiso vagans (Blackwall, 1834)	l	h
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)	l	h
Trichoncus affinis Kulczynski, 1894	l	es
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872)	l	s
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)	l	s
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872)	l	s
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833	l	h
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)	l	s
Walckenaeria antica (Wider, 1834)	l	mh
Walckenaeria atrotibialis O. P.-Cambridge, 1878	l	h
Walckenaeria capito (Westring, 1861)	l	es
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875)	l	mh
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836)	l	mh
Walckenaeria cuspidata (C. L. Koch, 1836)	l	s
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)	l	h
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)	l	mh
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872)	l	s
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)	l	ss
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)	l	mh
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836	l	es
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861	l	h
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)	l	mh
Wiehlea calcarifera (Simon, 1884)	l	es
Tetragnathidae - Streckerspinnen		
Meta menardi (Latreille, 1804)	l	es
Metellina mengei (Blackwall, 1869)	l	h
Metellina merianae (Scopoli, 1763)	l	h
Metellina segmentata (Clerck, 1757)	l	sh
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823	l	sh
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830	l	sh
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830	l	s
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)	l	sh
Tetragnatha montana Simon, 1874	l	h
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886	l	s
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837	l	s
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870	l	mh
Araneidae - Radnetzspinnen		
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)	l	sh

Name	St.	BE
<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	I	sh
<i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802)	I	s
<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757	I	ss
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757	I	sh
<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	I	sh
<i>Araneus sturmi</i> (Hahn, 1831)	I	s
<i>Araneus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)	I	s
<i>Araniella alpica</i> (L. Koch, 1869)	I	es
<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)	I	s
<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	I	sh
<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)	I	mh
<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	I	mh
<i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)	I	h
<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	I	mh
<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)	I	mh
<i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851)	I	ss
<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)	I	ss
<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)	I	s
<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C. L. Koch, 1844)	I	h
<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1757)	I	es
<i>Larinioides sclopetarius</i> (Clerck, 1757)	I	mh
<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	I	sh
<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	I	h
<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1757)	I	h
<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Singa nitidula</i> C. L. Koch, 1844	I	ss
<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	I	h
<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1757)	I	s
Lycosidae - Wolfsspinnen		
<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Alopecosa farinosa</i> (Herman, 1879)	I	mh
<i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757)	I	es
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	I	mh
<i>Arctosa figurata</i> (Simon, 1876)	I	es
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	I	h
<i>Arctosa lutetiana</i> (Simon, 1876)	I	s
<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	I	s
<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	I	sh
<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	I	mh
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	I	sh
<i>Pardosa lugubris</i> s. l. (Walckenaer, 1802)	I	sh
<i>Pardosa lugubris</i> s. str. (Walckenaer, 1802)	I	mh
<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	I	s
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	I	h
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	I	mh

Name	St.	BE
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	I	sh
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	I	sh
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Pardosa saltans</i> Toepfer-Hofmann, 1999	I	mh
<i>Pirata hygrophila</i> Thorell, 1872	I	mh
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	I	h
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	I	s
<i>Piratula knorri</i> (Scopoli, 1763)	I	mh
<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)	I	sh
<i>Piratula uliginosa</i> (Thorell, 1856)	I	mh
<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	I	s
<i>Trochosa ruricola</i> (Degeer, 1778)	I	h
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge, 1895)	I	mh
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	I	sh
<i>Xerolycosa miniata</i> (C. L. Koch, 1834)	I	h
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	I	h
Pisauridae - Jagdspinnen		
<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)	I	mh
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	I	sh
Agelenidae - Trichterspinnen		
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)	I	sh
<i>Allagelena gracilens</i> (C. L. Koch, 1841)	I	mh
<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)	I	h
<i>Eratigena agrestis</i> (Walckenaer, 1802)	I	s
<i>Eratigena atrica</i> (C. L. Koch, 1843)	I	s
<i>Eratigena picta</i> (Simon, 1870)	I	h
<i>Histopona torpida</i> (C. L. Koch, 1837)	I	h
<i>Inermocoelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	I	h
<i>Tegenaria ferruginea</i> (Panzer, 1804)	I	s
<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	I	mh
Hahniidae - Bodenspinnen		
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	I	h
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	I	mh
<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875	I	ss
<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	I	h
<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875	I	ss
<i>Hahnia pusilla</i> C. L. Koch, 1841	I	h
<i>Iberina montana</i> (Blackwall, 1841)	I	ss
Cybaeidae - Gebirgstrichterspinnen		
<i>Cryphoeca silvicola</i> (C. L. Koch, 1834)	I	es
Dictynidae - Kräuselspinnen		
<i>Argenna subnigra</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	I	h
<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	I	sh
<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	N	mh
<i>Brigittea latens</i> (Fabricius, 1775)	I	mh
<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	I	ss
<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	I	mh
<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	I	mh
<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1825)	I	mh

Name	St.	BE
<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)	I	s
Amaurobiidae - Finsterspinnen		
<i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768)	I	mh
<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1825)	I	s
<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	I	s
Titanoecidae - Kalksteinspinnen		
<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1833)	I	mh
Oxyopidae - Luchsspinnen		
<i>Oxyopes ramosus</i> (Martini & Goeze, 1778)	I	ss
Anypheidae - Zartspinnen		
<i>Anypheana accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	I	sh
Liocranidae - Feldspinnen		
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	I	mh
<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873	I	s
<i>Agroeca proxima</i> (O. P.-Cambridge, 1870)	I	s
<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851	I	mh
<i>Liocranoeca striata</i> (Kulczynski, 1882)	I	s
<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)	I	es
<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)	I	es
<i>Scotina palliardii</i> (L. Koch, 1881)	I	s
Phrurolithidae - Ameisensackspinnen		
<i>Phrurolithus festivus</i> (C. L. Koch, 1835)	I	sh
<i>Phrurolithus minimus</i> C. L. Koch, 1839	I	mh
Clubionidae - Sackspinnen		
<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841	I	mh
<i>Clubiona caerulea</i> L. Koch, 1867	I	ss
<i>Clubiona comta</i> C. L. Koch, 1839	I	h
<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)	I	s
<i>Clubiona diversa</i> O. P.-Cambridge, 1862	I	h
<i>Clubiona frutetorum</i> L. Koch, 1867	I	ss
<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	I	h
<i>Clubiona neglecta</i> O. P.-Cambridge, 1862	I	h
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	I	s
<i>Clubiona phragmitis</i> C. L. Koch, 1843	I	mh
<i>Clubiona reclusa</i> O. P.-Cambridge, 1863	I	sh
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski, 1897	I	h
<i>Clubiona subsultans</i> Thorell, 1875	I	es
<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	I	mh
<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1862	I	mh
Cheiracanthiidae - Dornfingerspinnen		
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	I	h
<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	I	sh
<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	I	mh
Trachelidae - Glattbeinspinnen		
<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	I	es
Zodariidae - Ameisenjäger		
<i>Zodarion italicum</i> (Canestrini, 1868)	I	mh
<i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914	I	es
Gnaphosidae - Plattbauchspinnen		

Name	St.	BE
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)	I	mh
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)	I	h
Drassodex lesserti (Schenkel, 1936)	I	s
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)	I	h
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)	I	h
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)	I	s
Drassyllus praeificus (L. Koch, 1866)	I	h
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)	I	s
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)	I	sh
Echemus angustifrons (Westring, 1861)	I	es
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)	I	s
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)	I	ss
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839)	I	es
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)	I	es
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942	I	ss
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879)	I	ss
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)	I	h
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)	I	mh
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)	I	mh
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866)	I	es
Micaria formicaria (Sundevall, 1832)	I	es
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)	I	s
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839)	I	es
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)	I	h
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)	I	ss
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)	I	es
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)	I	s
Zelotes aeneus (Simon, 1878)	I	s
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)	I	s
Zelotes erebeus (Thorell, 1870)	I	es
Zelotes latreillei (Simon, 1878)	I	h
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)	I	s
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)	I	h
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)	I	h
Zoropsidae - Kräusel-Jagdspinnen		
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) ^	N	es
Miturgidae - Wanderspinnen		
Zora nemoralis (Blackwall, 1861)	I	s
Zora silvestris Kulczynski, 1897	I	s
Zora spinimana (Sundevall, 1833)	I	sh
Sparassidae - Riesenkrabbenspinnen		
Micrommata virescens (Clerck, 1757)	I	s
Philodromidae - Laufspinnen		
Philodromus albidus Kulczynski, 1911	I	s
Philodromus aureolus (Clerck, 1757)	I	s
Philodromus buxi Simon, 1884	I	es
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)	I	sh
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835	I	mh
Philodromus dispar Walckenaer, 1825	I	mh

Name	St.	BE
<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1757)	l	ss
<i>Philodromus praedatus</i> O. P.-Cambridge, 1871	l	s
<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826	l	mh
<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	l	s
<i>Thanatus striatus</i> C. L. Koch, 1845	l	s
<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	l	sh
Thomisidae - Krabbenspinnen		
<i>Coriarachne depressa</i> (C. L. Koch, 1837)	l	es
<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)	l	h
<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	l	h
<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	l	h
<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	l	mh
<i>Ozyptila brevipes</i> (Hahn, 1826)	l	s
<i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837)	l	s
<i>Ozyptila praticola</i> (C. L. Koch, 1837)	l	mh
<i>Ozyptila pullata</i> (Thorell, 1875)	l	es
<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)	l	es
<i>Ozyptila simplex</i> (O. P.-Cambridge, 1862)	l	h
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	l	mh
<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)	l	es
<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	l	es
<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)	l	mh
<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872	l	sh
<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)	l	s
<i>Xysticus bifasciatus</i> C. L. Koch, 1837	l	h
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	l	sh
<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	l	mh
<i>Xysticus kempeleni</i> Thorell, 1872	l	s
<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	l	sh
<i>Xysticus lanio</i> C. L. Koch, 1835	l	s
<i>Xysticus lineatus</i> (Westring, 1851)	l	mh
<i>Xysticus luctator</i> (cambridgei) L. Koch, 1870	l	s
<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)	l	ss
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1832)	l	sh
Salticidae - Springspinnen		
<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)	l	h
<i>Attulus distinguendus</i> (Simon, 1868)	l	ss
<i>Attulus penicillatus</i> (Simon, 1875)	l	es
<i>Attulus saltator</i> (O. P.-Cambridge, 1868)	l	s
<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	l	h
<i>Calositticus floricola</i> (C. L. Koch, 1837)	l	mh
<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819) ^	l	es
<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)	l	es
<i>Dendryphantès rudis</i> (Sundevall, 1832)	l	es
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	l	h
<i>Euophrys petrensis</i> (C. L. Koch, 1837)	l	s
<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	l	sh
<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	l	h
<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1831)	l	h

Name	St.	BE
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835	I	mh
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)	I	sh
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)	I	h
Heliophanus tribulosus Simon, 1868	I	ss
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775)	I	s
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ^	N	es
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)	I	sh
Marpissa radiata (Grube, 1859)	I	h
Myrmarachne formicaria (Degeer, 1778)	I	s
Neon levis (Simon, 1871)	I	es
Neon reticulatus (Blackwall, 1853)	I	mh
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)	I	mh
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)	I	h
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)	I	s
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)	N	s
Saitis barbipes (Simon, 1864) ^	U	
Salticus cingulatus (Panzer, 1797)	I	es
Salticus scenicus (Clerck, 1757)	I	sh
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)	I	s
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)	I	mh
Synageles venator (Lucas, 1836)	I	mh
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871)	I	h
Talavera inopinata Wunderlich, 1993	I	h

Kommentare

- Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819): Diese Springspinne ist in den Wärme- und Trockengebieten Süddeutschland weit verbreitet, war aber immer selten. Seit etwa 1990 wird sie häufiger und weitet ihr Areal gleichzeitig aus. In diesem Zusammenhang ist wohl auch das Auftauchen im Saarland zu sehen. Derzeit liegen aber erst drei Beobachtungen vor (E Düppenweiler, Waldsaum, 10.05.2015, Obs. A. Staudt; zw. St. Ingbert-Ost u. Rohrbach, südexponierter Waldwegrand, 09.06.2016, Obs. Ulf Heseler und NSG Himsklamm bei Niedergailbach, 22.04.2019, Obs. Michael Münz).
- Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802): Die aus Südeuropa stammende Springspinnenart breitet sich seit ca. 1995 im Rheintal aus. Im Saarland wurde sie erst einmal nachgewiesen (Lebach, Gebäude, 21.07.2009, Obs. A. Staudt).
- Saitis barbipes* (Simon, 1864): Die in Südeuropa verbreitete Springspinnenart wurde am 24.07.2014 in Saarlouis-Picard im Innern eines Hauses beobachtet (Obs. A. Staudt). Für Deutschland liegen weitere 11 Beobachtungen vor (Arachnologische Gesellschaft 2019). Auch in Belgien und den Niederlanden ist sie schon gefunden worden (van Helsdingen, 2000, Lambeers et al. 2007). Derzeit gilt sie aber nördlich der Alpen noch als nicht etabliert, wobei aber das Verbreitungsgebiet in der atlantischen Region Frankreichs durchaus bis ins Pariser Becken reicht, im Rhôneetal bis nach Lyon.
- Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820): Diese Art aus der Familie der Kräusel-Jagdspinnen (Zoropsidae) breitet sich seit ca. 15 Jahren in Westdeutschland aus. Inzwischen ist das Rheintal von Basel bis Kleve schon fast flächendeckend besiedelt. Aus dem Saarland ist bisher erst eine Beobachtung bekannt geworden (Obs. Kai Sonnhalter, St. Johann). Weitere Fundmeldungen aus der Region stammen aus Distroff bei Thionville (Obs. Louis Weitten, 17.04.2014) und aus dem Nahetal bei Kirn (Obs. Jörg Römer, 25.03.2019). Alle bisherigen Funde wurden im Inneren von Gebäuden gemacht.

Liste der Synonyme

In dieser Liste werden nomenklatorischen und taxonomische Synonyme aufgeführt. Insbesondere werden solche Namen aufgenommen, die dem Verständnis der Liste und der Nachvollziehbarkeit der Eintragungen dienen.

Achaearana lunata (Clerck, 1757) → *Parasteatoda lunata* (Clerck, 1757)
Achaearana riparia (Blackwall, 1834) → *Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834)
Achaearana simulans (Thorell, 1875) → *Parasteatoda simulans* (Thorell, 1875)
Achaearana tepidariorum (C. L. Koch, 1841) → *Parasteatoda tepidariorum* (C. L. Koch, 1841)
Agelena gracilens (C. L. Koch, 1841) → *Allagelena gracilens* (C. L. Koch, 1841)
Dictyna civica (Lucas, 1850) → *Brigittea civica* (Lucas, 1850)
Dictyna latens (Fabricius, 1775) → *Brigittea latens* (Fabricius, 1775)
Dipoena coracina (C. L. Koch, 1837) → *Lasaeola coracina* (C. L. Koch, 1837)
Dipoena inornata (O. P.-Cambridge, 1861) → *Phycosoma inornatum* (O. P.-Cambridge, 1861)
Drassodes hispanus Lesserti Schenkel, 1936 → *Drassodex lesserti* (Schenkel, 1936)
Eperigone trilobata (Emerton, 1882) → *Mermessus trilobatus* (Emerton, 1882)
Eurocoelotes inermis (L. Koch, 1855) → *Inermocoelotes inermis* (L. Koch, 1855)
Hahnina montana (Blackwall, 1841) → *Iberina montana* (Blackwall, 1841)
Meioneta affinis (Kulczynski, 1898) → *Agyneta affinis* (Kulczynski, 1898)
Meioneta equestris (L. Koch, 1881) → *Agyneta equestris* (L. Koch, 1881)
Meioneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) → *Agyneta innotabilis* (O. P.-Cambridge, 1863)
Meioneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) → *Agyneta mollis* (O. P.-Cambridge, 1871)
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) → *Agyneta rurestris* (C. L. Koch, 1836)
Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844) → *Agyneta saxatilis* (Blackwall, 1844)
Misumenops tricuspидatus (Fabricius, 1775) → *Ebrechtella tricuspидata* (Fabricius, 1775)
Pirata knorri (Scopoli, 1763) → *Piratula knorri* (Scopoli, 1763)
Pirata latitans (Blackwall, 1841) → *Piratula latitans* (Blackwall, 1841)
Pirata uliginosa (Thorell, 1856) → *Piratula uliginosa* (Thorell, 1856)
Porrhomma lativelum Tretzel, 1956 → *Porrhomma microps* (Roewer, 1931)
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) → *Attulus distinguendus* (Simon, 1868)
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) → *Calositticus floricola* (C. L. Koch, 1837)
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) → *Attulus penicillatus* (Simon, 1875)
Sitticus pubescens (Fabricius, 1775) → *Hypositticus pubescens* (Fabricius, 1775)
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) → *Attulus saltator* (O. P.-Cambridge, 1868)
Steatoda phalerata (Panzer, 1801) → *Asagena phalerata* (Panzer, 1801)
Styloctetor stativus (Simon, 1881) → *Styloctetor compar* (Westring, 1861)
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) → *Euophrys petrensis* (C. L. Koch, 1837)
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) → *Eratigena agrestis* (Walckenaer, 1802)
Tegenaria atrica (C. L. Koch, 1843) → *Eratigena atrica* (C. L. Koch, 1843)
Tegenaria picta (Simon, 1870) → *Eratigena picta* (Simon, 1870)
Theridion impressum (L. Koch, 1881) → *Phylloneta impressa* (L. Koch, 1881)
Theridion nigrovariegatum (Simon, 1873) → *Heterotheridion nigrovariegatum* (Simon, 1873)
Theridion sisyphium (Clerck, 1757) → *Phylloneta sisyphia* (Clerck, 1757)
Troxochrus nasutus (Schenkel, 1925) → *Nusoncus nasutus* (Schenkel, 1925)

Literatur

- ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT (Hrsg.) (2019): Atlas der Spinnentiere Europas, abgerufen von <https://atlas.arages.de> am 01.09.2019.
- HELSDINGEN, P.J. VAN (2000): *Saitis barbipes* (Salticidae) in Nederland? — Nieuwsbrief Spined 15: 22
- LAMBEETS, K., R. BOSMANS & BONTE, D. (2007): Two exotic spider species (Araneae), *Zoropsis spinimana* (Zoropsidae) and *Saitis barbipes* (Salticidae), recently found in the inner city of Ghent (Belgium). — Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver. 22 (2): 55-60.
- PLATNICK, N. I. (2014): The world spider catalog, version 15. American Museum of Natural History, online at <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html> DOI: 10.5531/db.iz.0001.

STAUDT, A. (2008): Checkliste der Webspinnen (Arachnida, Araneae) des Saarlandes. 2. Fassung. — In: Ministerium für Umwelt & DELATTINIA (Hrsg.) (2008): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. — Atlantenreihe Band **4** (= Aus Natur und Landschaft im Saarland, Sonderband **10**): 531-554.

Anschrift des Autors:

Aloysius Staudt
Reimsbacher Str. 40
66839 Schmelz
alloys3@yahoo.de